

Номер партии соответствует дате изготовления, указанной на кромке пакета



Универсальный
антистрессовый
адаптоген

Эффективная
защита от
заморозков

Восстановление
повреждённых
растений



Разработано и произведено: ННПП «НЭСТ М», Россия
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.31А, к.116
т. (499) 976-27-06, т/ф (499) 976-47-36,
e-mail: info@nest-m.ru www.nest-m.ru www.tdnest-m.ru

ЭТИМ ЭКСТРАКТОМ

ВСЕГДА БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ



Заказ № 2272014-2015 23.09.14 г.



АГРОМИКС ЦИРКОН МАКСИ

12 мл

корнеобразователь
индуктор цветения
плодообразования

эффективная
защита
от засухи

увеличение срока
хранения продукции

для плодовых, овощных, ягодных и цветочных культур, а также комнатных растений

ОТЗОВИК



ЭМПИКОН МАКРО

0,01 г/л гидроксикоричных кислот

- Увеличивает всхожесть семян (особенно некондиционные);
- Гарантированно ускоряет рассаду, черенки, одно- и многолетники, хвойные;
- Защищает от стрессов, снижает фитопатогенность картофеля и томатов, пероноспороз, огурцов, паршу картофеля и яблоки, бактериоз, фузариоз, корневые гнили, особенно серую гниль земляники, мучнистую росу роз и черной смородины, монилиоз косточковых и т.д.

- Уменьшает вдвое норму расхода при совместном применении.

Рекомендации по применению:
В 1 мл содержится 40 капель. Предпосевная и предпосадочная обработка семян (100 мл воды) на 6-8 часов. 1 л на 100 кг, семена цветочных культур (100 мл воды) на 18-20 часов. Черенки (100 мл воды) на 18-20 часов. Опрыскивание вегетирующих растений (100 мл воды) на 18-20 часов.

При стрессах (посадки, засуха, заморозки) опрыскивание проводят на протяжении всего периода вегетации. Раствор используют в день приготовления.

Культура	Рекомендуемая норма расхода (л/га)	Особенности применения
Томат	200	после высадки; цветение 1-ой кисти; цветение 3-4 кисти
Огурец	200	после высадки; бутонизация
Перец, баклажан	200	после высадки; бутонизация
Картофель	130	после высадки; начало бутонизации
Калуста б/к, цветная	120	после высадки; завязывания кочана
Корнеллы	400	после высадки; по всходам
Арбуз, дыня, кабачок	200	после высадки; бутонизация
Земляника, ягоды	100	после высадки; бутонизация
Яблоня, груша	100	после высадки; через 2 недели после цветения. Расход 5-10 л на дерево
Вишня, черешня	100	после высадки; через 2 недели после цветения. Расход 5-10 л на дерево
Хвойные	100	после высадки; взрослые растения
Цветочные и декоративные культуры	100	после высадки; начало отращивания побегов

Хранение: отдельные препараты и продукты питания в темном, недоступном для детей месте при температуре до +25°C. Пустую упаковку сжигать в мусорном баке. **Меры безопасности:** препарат малоопасное вещество. Для приготовления раствора использовать защитную одежду, очки, респиратор, перчатки. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. В случае попадания препарата в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды с активированным углем (5-6 таб. на стакан), затем солевой раствор слабительного.

Гарантийный срок хранения: 5 лет в нераскрытой упаковке.
Дата производства и номер партии указаны на упаковке.
Позволено для розничной торговли.
См. также в государственной регистрации.
№05.03.02.04.65.901 от 06.11.2014 г.
ТУ 20.2-2367.2704-007.2014
Объем нетто: 2 мл.
Рекомендовано ООО «АгроМакс», Украина, 61070, г. Харьков, ул. Шереметьева, 327, тел./факс: +38 (057) 714-05-50, тел.: +38 (097) 801-00-00; e-mail: agromax@ukr.net





ЭКО-БИО

ЭПИН-БИО

- Универсальный антистрессовый адаптоген
- Иммуномодулятор
- Восстанавливает повреждённые растения



2 мл

Высокий урожай!

Edenland.com.ua

ЦИРКОН

ЭКОМИКС-БИО

2
МЛ

корнеобразователь

регулятор цветения

защита от засухи

Greenland.com.ua

увеличение сроков хранения

Запатентовано. Патент РФ № 2272044 от 13.09.04 г.



ЭПИН- ЭКСТРА®

Универсальный
антистрессовый
адаптоген

Эффективная
защита от
заморозков

Восстановление
поврежденных
растений

**ВСЕГДА
БОЛЬШОЙ
УРОЖАЙ**

АГРОХИМ
КОМПАНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ



www.nest-m.ru
www.tdnest-m.ru



Расфасовано: ОАО «БелРеахим»

Номер партии соответствует дате изготовления указанной на этикетке пакета.

Дата изготовления указана на кромке пакета



Корне-
образователь,
индуктор
цветения и
болезне-
устойчивости.

Эффективная
защита от
засухи.

Природное
происхождение.

Увеличение
срока хранения
продукции.



Циркон®

ВСЕГДА
здоровый
Урожай



Препарат защищён авторскими правами.

Разработано и изготовлено: ННПП "НЭСТ М" Россия,
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31 "А" к. 110
т.: 976-27-06, т./ф. 976-47-36 e-mail: nest-m@df.ru

Дата изготовления указана на кромке пакета.

ПОД ЗАЩИТОЙ
Нэст М
ПРИРОДЫ

Универсальный
антистрессовый
адаптоген.
Эффективная
защита от
заморозков.
Восстановление
поврежденных
растений.

**ВСЕГДА
БОЛЬШОЙ
УРОЖАЙ**

**ЭПИН-
ЭКСТРА®**

ОБЪЕМ
1 МА



Разработано и произведено: ННПП «НЭСТ М», Россия,
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31 «А», к.110,
т. (495) 976-27-06, т./ф. (495) 976-47-36,
e-mail: nest-m@df.ru www.nest-m.ru

Запатентовано. Патент РФ № 2272044 от 13.09.04 г.

Епін +

Універсальний антистресовий
адаптоген.
Ефективно захищає від заморозків.
Сприяє відновленню пошкоджених
рослин.



1 мл

Епін +

Універсальний антистресовий
адаптоген.
Ефективно захищає від заморозків.
Сприяє відновленню пошкоджених
рослин.



1 мл

Застосовується для прискорення проростання насіння, вкорінення черешків, живців, посилення росту і розвитку рослин, підвищення врожайності, стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища, відновлення ослаблених рослин.

Застосовувати згідно таблиці

Культура	Норми витрати	Час та спосіб обробки
Насіння	2-3 краплі на 100 мл води	замочити перед посівом на 2-4 години
Бульби, цибулини, саджанці	0,5 мл на 1 л води	обприскати або замочити на 2-4 години перед висаджуванням
Живці	1 мл на 1 л води	замочити живці на 12-24 години
Розсада	0,2 мл на 1 л води	обприскати за добу перед висаджуванням в ґрунт, або одразу після висаджування
Картопля	1 мл на 250 мл води	обприскати бульби перед висаджуванням
	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу бутонізації — початку цвітіння
Овочеві культури	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу 2-3 справжніх листків, потім в період бутонізації — цвітіння
	0,5 мл на 1 л води	обприскати відразу після заморозків
Плодові та ягідні культури	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу бутонізації та через 15-20 днів після цвітіння
	1 мл на 10 л води	обприскати до обпадання листя
Квіткові, декоративні та хвойні культури	1 мл на 10 л води	обприскати в фазу бутонізації, цвітіння

Робочий розчин використовувати в день приготування.

Діюча речовина: 0,025 г/л епібрассіноліда.

При приготуванні розчину дотримуватися правил особистої гігієни.

Берегти від дітей!

Виробник: ТОВ «Восор».

Україна, м. Запоріжжя, вул. Сковороди, 38,

згідно з ТУ У 20.1-20487748-004:2015.

Дистриб'ютор в Україні ТД "Киссон",

тел. (061) 213-31-91, www.kisson-agro.com.ua

Дата виготовлення зазначена на упаковці. Термін зберігання — 3 роки.



Бульби, цибулини, саджанці	0,5 мл на 1 л води	обприскати або замочити на 2–4 години перед висаджуванням
Живці	1 мл на 1 л води	замочити живці на 12–24 години
Розсада	0,2 мл на 1 л води	обприскати за добу перед висаджуванням в ґрунт, або одразу після висаджування
Картопля	1 мл на 250 мл води	обприскати бульби перед висаджуванням
	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу бутонізації — початку цвітіння
Овочеві культури	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу 2–3 справжніх листків, потім в період бутонізації — цвітіння
	0,5 мл на 1 л води	обприскати відразу після заморозків
Плодові та ягідні культури	1 мл на 5 л води	обприскати в фазу бутонізації та через 15–20 днів після цвітіння
	1 мл на 10 л води	обприскати до обладання листя
Квіткові, декоративні та хвойні культури	1 мл на 10 л води	обприскати в фазу бутонізації, цвітіння

Робочий розчин використовувати в день приготування.

Діюча речовина: 0,025 г/л епібрассіноліда.

При приготуванні розчину дотримуватися правил особистої гігієни.

Берегти від дітей!

Виробник: ТОВ «Восор».

Україна, м. Запоріжжя, вул. Сковороди, 38,
згідно з ТУ У 20.1-20487748-004:2015.

Дистриб'ютор в Україні ТД "Киссон",

тел. (061) 213-31-91, www.kisson-agro.com.ua

Дата виготовлення зазначена на
упаковці. Термін зберігання — 3 роки.



