



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 1775 от « 26 » февраля 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано

АНО «НЭСТ М», ОГРН 1177700021641 (взамен ранее выданного
свидетельства о государственной регистрации от 30 марта 2016 г. №1054)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот)


(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 233-07-1775-1

на срок по « 29 » марта 2026 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев


(подпись)

№002001



Приложение № 13 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Назначение	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,04 мл/100 мл воды	Горох	Повышение полевой всхожести, иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 100 мл/кг	- (1)
0,35 мл /3,5 л воды			Опрыскивание в фазе бутонизация – начало цветения. Расход рабочей жидкости - 3,5 л/100 м ²	
2,0 мл/10 л воды	Картофель	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение общей и товарной урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание клубней или кратковременное погружение в раствор препарата. Расход рабочей жидкости - 1 л/100 кг	- (2)
0,3-0,6 мл /3 л воды			Опрыскивание: 1-е – в фазе полных всходов, 2-е – в фазе начала бутонизации. Расход рабочей жидкости - 3 л /100 м ²	
0,1-0,2 мл/150 мл воды	Томат (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 150 мл/100 г	-(1)
0,3-0,6 мл/3 л воды			Опрыскивание : 1-е – за 1-2 дня до высадки рассады, 2-е – в начале бутонизации, 3-е – в период массового цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
				-(3)

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 14 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
0,1-0,2 мл/100 мл воды	Огурец (открытый и защищенный грунт)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)
0,3-0,6 мл /3 л воды			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100 м ²	
0,1-0,2 мл/200 мл воды	Баклажан (открытый и защищенный грунт)		Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	
0,3-0,6 мл /3 л воды			Опрыскивание в фазе цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100 м ²	
0,1-0,2 мл/100 мл воды	Перец сладкий (открытый и защищенный грунт)		Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)
0,3-0,6 мл /3 л воды			Опрыскивание растений в фазе цветения. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
0,1 мл/100 мл воды	Капуста белокочанная		Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(2)
0,4 мл/4 л воды			Опрыскивание: 1-е – в фазе 5-6 листьев, 2-е - в фазе начала образования кочана. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	
0,1 мл/100мл воды	Капуста цветная		Замачивание семян на 1-2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	-(1)
0,15-0,3 мл/1,5 л воды			Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3-х настоящих листьев. Расход рабочей жидкости - 1,5 л/ 100 м ²	
0,25-0,5 мл/2,5 л воды			Опрыскивание через 7 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости - 2,5 л/100 м ²	

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 15 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
0,02-0,03 мл/100мл воды	Морковь	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 1- 2 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл/100 г	- (1)
0,4 мл /4 л воды			Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3-х листьев, 2-е - в фазе пучковой спелости (8-10 листьев). Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	- (2)
0,1 мл/350 мл воды	Арбуз	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 4- 8 часов. Расход рабочей жидкости - 350 мл/100 г	- (1)
0,3-0,6 мл/3 л воды			Опрыскивание: 1-е - в фазе «шатрика», 2- е - в начале цветения, 3- е - в начале формирования завязей. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	- (3)
0,1 мл/ 350 мл воды	Дыня	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, ускорение созревания, увеличение выхода ранней продукции, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Замачивание семян на 4- 8 часов. Расход рабочей жидкости - 350 мл/100 г	- (1)
0,3-0,6 мл/3 л воды			Опрыскивание: 1-е - в фазе 2-3-х настоящих листьев, 2-е - в начале цветения, 3-е - в начале формирования завязей. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	- (3)

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений И.А. Чекмарев



Приложение № 16 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
2 мл/8-10 л воды	Виноград (южная зона промышленного возделывания)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение степени вызревания побегов,	Опрыскивание: 1-е – в конце фазы цветения, 2-е – через 14 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости - 8-10 л/100 м ²	- (2)
4 мл/8-10 л воды	Виноград (северная зона промышленного возделывания)	повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 5–10 л на 1 дерево	- (1)
1 мл/5-10 л воды	Плодовые культуры (семечковые)	Повышение полевой всхожести, активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, улучшение качества сеянцев	Замачивание семян на 18 часов. Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	
0,2 мл/200 мл воды	Плодовые культуры (семечковые)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, снижение опадания завязей, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 5 л/дерево	
1,25 мл /5 л воды	Черешня, вишня, слива	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²		
0,5-1,0 мл/ 5 л воды	Алыча	Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²		
0,3-0,6 мл/ 3 л воды	Земляника			
0,4 мл/4 л воды	Смородина черная			

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Зекмарев



Приложение № 17 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
0,4-0,8 мл/4 л воды	Роза (защищенный грунт)	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления цветения, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание растений в начале отрастания побегов. Расход рабочей жидкости - 4 л/100 м ²	- (1)
0,1-0,2 мл/л воды	Хризантема, гелениум		Опрыскивание растений перед формированием бутонов. Расход рабочей жидкости - 1 л/30 м ²	
0,7 мл/3 л воды	Хризантема корейская	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых и формообразовательных процессов, ускорение наступления фазы бутонизации и цветения, повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание после посадки. Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100 м ²	
1 мл/л воды	Цветочно- декоративные культуры (луковичные, клубнелуковичные)	Активизация ростовых процессов, ускорение наступления и цветения, повышение декоративных качеств	Замачивание посадочного материала на 20-22 часа перед посадкой. Расход рабочей жидкости - 1 л/кг	
0,6-1 мл/3 л воды	Шиповник	Активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды, повышение декоративных качеств	Опрыскивание: 1-е – весной, в фазе отрастания побегов, 2-е – в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 3 л/ 100 м ²	- (2)

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений И.А. Чекмарев



Приложение № 18 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
0,02 мл/200 мл воды	Кедр сибирский, кедр корейский	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа. Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	- (2)
0,002 мл/200 мл воды	Пихта кавказская		Замачивание семян на 24 часа. Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	
0,3 мл/3 л воды	Сосна крымская	Активизация ростовых процессов	Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного периода (июнь-июль). Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
0,02 мл/200 мл воды	Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ель обыкновенная	Повышение всхожести семян, улучшение роста корневой системы, активизация ростовых процессов	Замачивание семян на 24 часа. Расход рабочей жидкости - 200 мл/100 г	
0,3 мл/3 л воды			Опрыскивание сеянцев в середине вегетационного сезона (июнь-июль). Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
0,3 мл/3 л воды	Чубушник, бирючина, гортензия (саженцы)	Улучшение приживаемости растений, активизация ростовых процессов, повышение иммунитета к неблагоприятным факторам среды	Опрыскивание перед пересадкой. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
1,5 мл/3 л воды			Опрыскивание через день после пересадки. Расход рабочей жидкости - 3 л/100 м ²	
0,5-1,0 мл/л воды	Шиповник (корнеотпрыски)		Замачивание корневой системы на 14-16 часов. Расход рабочей жидкости - 10 л/30 растение	

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 19 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Циркон, Р (0,1 г/л гидроксикоричных кислот) от 26 февраля 2018 г. № 1775

1	2	3	4	5
0,1 мл/100 мл воды	Яблоня (черенки)	Ускорение появления каллуса и корней, увеличение зоны укоренения, активизация ростовых процессов, повышение приживаемости, улучшение качественных характеристик	Замачивание черенков на 18 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 20 черенков	- (1)
0,025 мл/100 мл воды	Груша (черенки)			
0,018 мл/100 мл воды	Слива (черенки)			
0,05 мл/100 мл воды	Вишня (черенки)		Замачивание черенков на 18 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 20 черенков	
0,012 мл/100 мл воды	Крыжовник (черенки)			
0,018 мл/100 мл воды	Смородина красная (черенки)			
0,02 мл/100 мл воды	Облепиха (черенки)		Замачивание черенков на 14-16 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 5 черенков	
0,02-0,025 мл/100 мл воды	Роза(черенки)		Замачивание черенков на 4 часа. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 20 черенков	
0,1 мл/100 мл воды	Сакура, туя западная (черенки)		Замачивание черенков на 14 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 50 черенков	
0,01 мл/100 мл воды	Дейция шершавая, миндаль трехлопастной, сирень, вишня войлочная (черенки)		Замачивание черенков на 14 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 50 черенков	
0,05-0,1 мл/100 мл воды	Клематис (черенки)		Замачивание черенков на 16 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 20 черенков	
0,05 мл/100 мл воды	Кипарисовик горохоплодный, ель колючая, можжевельник сибирский (черенки)		Замачивание черенков на 14 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 10 черенков	
0,05 мл/100 мл воды	Барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга (черенки)		Замачивание черенков на 18 часов. Расход рабочей жидкости - 100 мл на 10 черенков	

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Сроки выхода для ручных и механизированных работ не регламентируются.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений И. А. Чекмарев

